

薬価基準による歯科関係薬剤点数表

(平成26年4月1日現在)

目 次

歯科用薬剤..... 1

I. 特定薬剤..... 1

II. 麻酔薬剤（歯科用局所麻酔薬）..... 5

1. 表面麻酔薬..... 5

2. 浸潤・伝達麻酔薬..... 6

III. 吸入鎮静法..... 7

医療用医薬品..... 8

投薬料の算定について..... 8

注射料の算定について.....11

薬剤情報提供料の算定について.....11

使用薬剤の内容に係るレセプト

記載について.....11

内用薬・注射薬・外用薬

・解熱鎮痛消炎薬（頓用）.....12

・催眠鎮静薬（頓用）.....13

・解熱鎮痛消炎薬.....14

・三叉神経痛用薬.....16

・精神神経用薬（抗不安薬）.....16

・抗ヒスタミン薬.....17

・抗菌薬（抗生物質および合成抗菌薬）...18

・抗菌薬（注射剤）.....22

・抗真菌薬.....23

・健胃消化整腸薬.....23

・ビタミン製剤.....25

・止血薬.....27

・酵素製剤（消炎酵素薬）.....28

・漢方薬.....28

・トローチ剤（外用）.....29

・含嗽剤（外用）.....29

・口腔用軟膏剤（外用）.....30

・その他の口腔用薬（外用）.....30

・坐薬（外用）.....31

〔資料〕 歯科適応のある抗菌薬（内用薬）

と解熱鎮痛消炎薬（内用薬）.....32

〔資料〕 保険医及び保険薬剤師の

使用医薬品（保険診療で使用

できる歯科用薬剤）.....36

〔解説〕 抗菌薬の使い方について.....37

日 本 歯 科 医 師 会

(注)

1. この点数早見表は、平成26年3月5日付をもって改正された薬価基準（平成26年4月1日適用）をもとに収載した。
2. 各薬剤の製品名・規格は、薬価基準に収載されたものを転記したもので、局方製品名については主な銘柄をカッコ内に表示したものがある。
3. 各薬剤の製品名の先頭あるいは末尾に㊞の印がついたものは後発医薬品である。
4. 医療用医薬品は、その有効性、安全性のバランスを考慮し、年齢、症状、体重などを勘案して投与することが必要である。
5. 点数表の薬価
 - ① 錠・カプセル剤は、年齢、症状などに応じた薬用量に相当する個数を計数により投与するので、1日当たりの投与個数に該当する点数を表示した。
 - ② 散(細粒を含む)・顆粒・ドライシロップ・シロップ剤・その他の液状の内用薬・外用薬・局所麻酔薬(歯科用局所麻酔薬を除く)は、年齢・症状・体重・適応などにより、個々に計量して投与することになるので、g・mL当たりの薬価を表示するにとどめた。
6. 掲載した医療用医薬品は、薬価基準に収載されている薬剤の一部であり、ここに掲載されていないものであっても、収載品の投与はもちろん可能であるが、効能・効果、用法・用量および副作用などを十分に考慮の上、投薬されたい。
7. 巻末に医薬品の適応症に合った適切な使用のために、特に歯科疾患の治療で使用頻度の高い抗菌薬と解熱鎮痛消炎薬の歯科適応症を「歯科適応のある抗菌薬(内用薬)」と「歯科適応のある解熱鎮痛消炎薬(内用薬)」を掲載。また解説として「抗菌薬の使い方について」を掲載した。
8. 平成26年4月の診療報酬改定より、後発医薬品のある医薬品について、一般名処方を含む処方せんを交付した場合は加算となることから一般名を表示した。(一部の医薬品を除く)

歯 科 用 薬 剤

I 特 定 薬 剤

特定薬剤は、「特掲診療料の施設基準等」（平成26年3月厚生労働省告示）の第十一及び第十二に規定する薬剤に限られるものである。

十一 歯科点数表第2章第8部（処置）に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価（薬価基準）〔平成26年3月厚生労働省告示第61号〕の別表第4部歯科用薬剤の外用薬(1)に掲げる薬剤（右表参照）及び次に掲げる薬剤であること。

- ケナログ口腔用軟膏0.1%
- アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
- テトラ・コーチゾン軟膏
- テラ・コートリル軟膏
- デルゾン口腔用軟膏0.1%

十二 歯科点数表第2章第9部（手術）に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価（薬価基準）〔平成26年3月厚生労働省告示第61号〕の別表第4部歯科用薬剤の外用薬(1)に掲げる薬剤（右表参照）及び次に掲げる薬剤であること。

- ケナログ口腔用軟膏0.1%
- アクリノール
- アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
- テトラ・コーチゾン軟膏
- テラ・コートリル軟膏
- デルゾン口腔用軟膏0.1%
- 生理食塩液

なお、特定薬剤はう蝕処置、残根削合、歯髄保護処置（歯髄覆罩）、知覚過敏処置、乳幼児う蝕薬物塗布処置、歯周基本治療、歯内療法及び120点以上の処置・手術の際には算定できない。

しかし、次の場合は特定薬剤料を算定できる。

- 基本診療料に含まれる簡単な処置及び手術において特定薬剤を使用したときは特定薬剤料のみ算定する。
- 歯周疾患処置時におけるポケット内の薬剤注入（4頁参照）
- 入院を必要とする手術を行った際、当該手術に使用した「生理食塩液」「アクリノール」。

特定薬剤の算定について

使用薬剤の薬価が40円を超える場合は当該薬価から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数

例）（コーン）（個数）

（請求点数）

$$16.90円 \times 4コ = 67.60円 \quad \frac{67.60円 - 40円}{10円} = 2.8点 \rightarrow 3点$$

別表第4部歯科用薬剤の外用薬（1）

オキシテトラコーン歯科用挿入剤 5 mg
コーバロン歯科用表面麻酔液 6 %
サージカルバック口腔用 散剤（液剤を含む）
歯科用 TD ゼット液
歯科用 TD ゼット・ゼリー
ジンジカインゲル20%
テトラサイクリン塩酸塩パスタ 3 %「昭和」
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏
ネオザロカインパスタ
ハリケインゲル歯科用20%
ハリケインリキッド歯科用20%
ビーゾカイン歯科用ゼリー20%
ヒノボロン口腔用軟膏
プロネスバスタアロマ
ペリオクリン歯科用軟膏
ペリオフィール歯科用軟膏 2 %

歯 科 用 挿 入 剤 (コーン)

製 品 名	オキシテトラコーン歯科用挿入剤 5mg	
一般名	オキシテトラサイクリン塩酸塩錠	
薬価	5mg 1 個	円 16.90
個	(点)	請求点数
1	1.7	0
2	3.4	0

抗 生 物 質 パ ス タ

製品名		テトラサイクリン塩酸塩 パスタ3%「昭和」	テトラサイクリン・プレ ステロン歯科用軟膏
		(TCパスタ)	(TCPSパスタ)
一般名		テトラサイクリン塩酸塩パスタ	エピジヒドロコレスチリン テトラサイクリン塩酸塩軟膏
薬 価		円 30mg 1 g 228.70	円 1 g 233.30
点 数	1 歯	(点) 請求点数 4.6 1	(点) 請求点数 4.7 1
	1/3顎	(点) 請求点数 11.4 8	(点) 請求点数 11.7 8
	2/3顎	22.9 19	23.3 20
	1 顎	34.3 31	35.0 31

歯 肉 包 填 剤

製 品 名		サージカルパックス口腔用 ⑥
一 般 名		酸化亜鉛・チヨウジ油軟膏
薬 価		散剤 (液剤を) 含む 円 1 g 65.40
点 数	1/3顎	(点) 請求点数 19.6 16

止 血 薬

製 品 名		歯科用ＴＤゼット液	歯科用ＴＤゼット・ゼリー
一 般 名		塩化アルミニウム・ セチルピリジニウム配合剤液	塩化アルミニウム・ セチルピリジニウム配合剤ゼリー
薬 価		1 mL 円 293.80	1 g 円 304.60
点 数	1 歯	(点) 請求点数 4.4 1	(点) 請求点数 4.6 1

口 腔 用 軟 膏 剤

製品名		ケナログ口腔用 軟膏0.1%	アフタゾロン口腔用 軟膏0.1%	デルゾン口腔用 軟膏0.1% ㊞
一般名		トリアムシノロン アセトニド軟膏	デキサメタゾン軟膏	
薬 価		0.1% 1 g 円 69.60	0.1% 1 g 円 65.00	0.1% 1 g 円 59.80
点 数	1/3顎	(点) 請求点数 2.1 0	(点) 請求点数 2.0 0	(点) 請求点数 1.8 0
	2/3顎	4.2 1	3.9 0	3.6 0
	1 顎	6.3 3	5.9 2	5.4 2

注) 特定薬剤以外の品目は30頁参照

パ ス タ

製 品 名		ヒノポロン口腔用軟膏 (ＨＰパスタ)	テラ・コートリル軟膏 (ＴＫパスタ)
一 般 名		ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ ヒノキチオール配合剤軟膏	オキシテトラサイクリン 塩酸塩・ヒドロコルチゾン軟膏
薬 価		1 g 円 172.70	1 g 円 33.20
点 数	1 歯	(点) 請求点数 0.5 0	(点) 請求点数 0.1 0
	1/3顎	(点) 請求点数 1.2 0	(点) 請求点数 0.3 0
	2/3顎	2.3 0	0.7 0
	1 顎	3.5 0	1.0 0

歯 科 用 軟 膏 剤

製 品 名	ペリオクリン歯科用軟膏	ペリオフィール歯科用軟膏2% ②
一 般 名	ミノサイクリン塩酸塩軟膏	
薬 価	10mg0.5g 1 シリンジ 円 614.00	10mg0.5g 1 シリンジ 円 399.50
点 数	(点) 請求点数 61.4 58	(点) 請求点数 40.0 36

歯周疾患処置時におけるポケット内への薬剤注入について

歯周疾患処置時のポケット内への薬剤注入については、次に掲げるときには、用法・用量に従って、特定薬剤料として別に算定できること。

- (1) 歯周基本治療後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ、歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間注入したとき。
- (2) その後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合において、更に1月間継続注入したとき。
- (3) 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内に注入したとき。ただし、P急発の病名が必要である。

Ⅱ 麻酔薬剤（歯科用局所麻酔薬）

麻酔薬剤料の算定について

- 使用薬剤の薬価が40円以下の場合には麻酔の所定点数に含まれるので別に算定できない。
- 使用薬剤の薬価が40円を超える場合は当該薬価から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数を算定する。
- 1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて麻酔薬剤料を算定するものである。

例1	OA	歯科用キシロカイン ct	(請求点数)
	2.3点	+7.8点	= 10.1点 10.1点 - 4点 = 6.1点 → 7点
例2	OA	オーラ注歯科用 ct 1 mL	
	2.3点	+6.0点	= 8.3点 8.3点 - 4点 = 4.3点 → 5点
例3	歯科用キシロカイン ct	オーラ注歯科用 ct 1 mL	
	7.8点	+6.0点	= 13.8点 13.8点 - 4点 = 9.8点 → 10点

1. 表面麻酔薬

表面麻酔薬（OA）の適用について

- 浸潤麻酔又は伝達麻酔を行う際にその刺入点に用いた表面麻酔薬は麻酔薬剤として取り扱う。
- その他の場合に用いた表面麻酔薬は特定薬剤として扱う。
- 表面麻酔薬を嘔吐防止のために使用した場合

例) キシロカインポンプスプレー 8% OA 2 g 使用 4.6点 - 4点 = 0.6点 → 1点

表 面 麻 酔 薬 (OA)

製 品 名		キシロカインポンプスプレー 8% (後)	ネオザロカインパスタ	コーパロン 歯科用表面麻酔液 6%	プロネスパスタアロマ
一 般 名		リドカイン噴霧剤	アミノ安息香酸エチル・パラブチル アミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	テトラカイン塩酸塩貼付剤	アミノ安息香酸エチル・ ジブカイン塩酸塩配合剤軟膏
薬 価		1 g 円 23.60	1 g 円 115.70	1 枚 円 12.80	1 g 円 88.30
点 数	1～2 歯	2.3 点	2.3 点	2.3 点	2.3 点
	1/3 顎	5.4	5.4	5.4	5.4

製 品 名		ハリケインリキッド 歯科用 20% (後)	ハリケインゲル 歯科用 20% (後)	ビーゾカイン 歯科用ゼリー 20% (後)	ジンジカインゲル 20% (後)
一 般 名		アミノ安息香酸エチル液	アミノ安息香酸エチル液	アミノ安息香酸エチルゼリー	アミノ安息香酸エチル液軟膏
薬 価		1 g 円 66.70	1 g 円 66.70	1 g 円 66.70	1 g 円 66.70
点 数	1～2 歯	2.3 点	2.3 点	2.3 点	2.3 点
	1/3 顎	5.4	5.4	5.4	5.4

○表面麻酔薬（O A）と浸潤・伝達麻酔薬の併用

表面麻酔薬と浸潤・伝達麻酔薬との組合せ例

	請求点数
O A + オーラ注歯科用 ct（1 mL）	5
O A + 歯科用キシロカイン ct（1.8mL）	7
O A + 歯科用シタネストーオクタプレシン ct（1.8mL）	6

上下顎にわたる場合はO Aは2回分となる。

O A + スキャンドネストカートリッジ 3 %（1.8mL）	8
---------------------------------	---

但し、本剤の適用は浸麻のみで伝麻はない。

O A の場合にいう 1 ～ 2 歯とは、主に浸麻等を行う際の刺入点に対して使用するものであり、この場合の O A は麻酔薬剤として取り扱う。刺入点以外に用いた O A は特定薬剤として取り扱う。

2. 浸潤・伝達麻酔薬

注射用の歯科用局所麻酔薬には次のものがある。

歯科用局所麻酔薬

製 品 名		薬 価		点数
リド カ イ ア ン ド レ 塩 ナ リ ン 注 射 液	オーラ注歯科用 カートリッジ 1.0mL ⑥	1 mL 1 管	円 59.60	点 6.0
	オーラ注歯科用 カートリッジ 1.8mL ⑥	1.8mL 1 管	59.60	6.0
	キシレステシン A 注射液（カートリッジ）⑥	1.8mL 1 管	60.90	6.1
	歯科用キシロカイン カートリッジ	1.8mL 1 管	78.20	7.8
ブ塩 ロ酸 レ ピ塩 シ ト・ ン カ フ 注 イ エ 射 ン リ 液	歯科用シタネストー オクタプレシン カートリッジ	1.8mL 1 管	68.80	6.9
メ塩 ピ酸 バ カ 注 イ 射 ン 液	⑦ スキャンドネスト カートリッジ 3 %	3 % 1.8mL 1 管	92.00	9.2 ※

※但し、本剤の適用は浸麻のみで伝麻はない。

Ⅲ 吸入鎮靜法

吸入鎮静法は亜酸化窒素（笑気）等を用いてゲーデル（Guedel）の分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定する。

笑気吸入鎮静法の点数計算方法

◎算式

基本点数+笑気従量点数+酸素使用点数=請求点数

① — (笑気使用 L 数 $\times 1.9650 \times 4.30$ 円 - 40) $\div 10$
 ※ 1 点未満切上
 ② — 注) 使用酸素購入価格 $\div 10$
 (小数点以下四捨五入)

30分まで……………70 (105)

30分を超えた場合は30分又はその端数を増すごとに……10 (15)

笑気について（笑気ガス 1 g = 4.30円 〈平成26年 4 月〉）

笑気ガス1gは20℃において0.5089Lの容積を有するので、笑気ガスの使用L数に1.9650 (1/0.5089)を乗じ、使用g数を算出する。

注：使用した酸素の購入価格は当該年度の前年1月から12月までの間に購入した実績の加重平均に使用量(リットル)を乗じ、さらに補正率(1.3)を乗じたものとする。

ただし、使用した酸素の購入価格は次の価格を上限とする。

(離島等以外の場合) [酸素ボンベ]

○大型ボンベ0.41円/L ○小型ボンベ2.31円/L

$$\text{加重平均値} = \frac{\text{当該年度の前年1月から12月までの間に} \\ \text{当該保険医療機関が購入した酸素の対価}}{\text{当該購入した酸素の容積}} \\ \text{(単位リットル, 35℃1気圧で換算)}$$

※ 酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除した点数を併せて計算する。

酸素吸入の点数計算方法

注)

$$65\text{点}(1\text{日につき}) + \frac{\text{使用した酸素の購入価格}}{10} = \text{請求点数}$$

(四捨五入)

医 療 用 医 薬 品

◎投薬料の算定（外来の場合）について

請求点数＝処方料＋調剤料＋薬剤料（＋調剤技術基本料※）

ただし、処方せんを交付した場合は、処方せん料のみを算定する。

（※調剤技術基本料は、薬剤師が常時勤務する保険医療機関の場合）

1. 処方せん料

- (1) 所定様式による院外処方せんを交付した場合に限る。
- (2) 交付1回につき算定するもので、その際の処方せんの枚数、処方剤数、投与量（日数分）の如何を問わない。
- (3) 7種類以上の内服薬の投薬（ただし、臨時に投薬する場合であって、投与期間が2週間以内のものを除く）を行った場合の処方せん料は40点、それ以外の場合の処方せん料は68点である。
- (4) 3歳未満の乳幼児に対して処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回につき3点を加算する。
- (5) 後発医薬品のある医薬品について、一般名処方を含む処方せんを交付した場合（1品目でも一般名処方があれば可）は、交付1回につき2点を加算する。

2. 調 剤 料

内服薬・浸煎薬及び頓服薬：1回の処方に係わる調剤につき 9点

外 用 薬：1回の処方に係わる調剤につき 6点

○麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬は1処方につき1点を加算する。

注）外用薬の1調剤とは、外用薬を調剤した場合1回で投与する量のことである。例えば軟膏剤なら、5gでも50gでも1調剤であり、坐薬では5個や10個を調剤しても1調剤である。

3. 処 方 料

- (1) 7種類以上の内服薬の投薬（臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く）を行った場合の処方料は29点、それ以外の場合の処方料は42点である。
- (2) 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、1処方につき3点を加算する。
- (3) 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方した場合は、1処方につき1点を加算する。

4. 薬 剤 料

薬剤料は次のとおり算定する。

内服薬（浸煎薬を含む）	は 1 剤 1 日 分	┌
頓服薬	は 1 回 分	
外用薬	は 1 調 剤	

をそれぞれ1単位として薬価基準の薬価で次の二通りに分けて計算する。

- (1) 1 単位の薬価が15円以下である場合…… 1 点
 (2) 1 単位の薬価が15円を超える場合は次式により算定する。

$$1 \text{ 点} + \frac{(\text{薬価} - 15\text{円})}{10\text{円}} \text{ 点} \quad (1 \text{ 点未満の端数は切り上げ})$$

○ 1 処方につき 7 種類以上の内服薬の投薬（臨時に投薬する場合であって、投薬期間が 2 週間以内のものを除く）を行った場合には、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定する。

〔簡易換算表〕

15円まで…………… 1 点	55円超 ～ 65円迄…… 6 点
15円超 ～ 25円迄…… 2	65 〳 ～ 75 〳 …… 7
25 〳 ～ 35 〳 …… 3	75 〳 ～ 85 〳 …… 8
35 〳 ～ 45 〳 …… 4	85 〳 ～ 95 〳 …… 9
45 〳 ～ 55 〳 …… 5	95 〳 ～ 105 〳 …… 10

5. 処方料・調剤料・薬剤料の算定方法

＜算定例＞（調剤技術基本料を除く）

- (1) 内服薬 1 剤 3 日分を処方した場合

$$\begin{array}{ccc} \text{処方料} & \text{調剤料} & \text{薬剤料} \\ 42 \text{点} + 9 \text{点} + (1 \text{ 日分の薬価} \times 3 \text{ 日分}) \end{array}$$

- (2) 内服薬 1 剤 3 日分と頓服薬 2 回分、及び外用薬 1 種類を処方した場合

$$\begin{array}{cccc} \text{処方料} & \text{調剤料} & \text{薬剤料(内服薬)} & \text{薬剤料(頓服薬)} \\ 42 \text{点} + \{ 9 \text{点} + (1 \text{ 日分の薬価} \times 3 \text{ 日分}) + (1 \text{ 回分の薬価} \times 2 \text{ 回分}) \} \\ \\ & \text{調剤料(外用薬)} & \text{薬剤料(外用薬)} & \\ & + \{ 6 \text{点} + (1 \text{ 調剤の薬価}) \} \end{array}$$

6. 薬剤料計算例

1 回の処方について、2 種以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬包等に調剤しても、配合不適など特に定められた場合を除き、服用時点が同時で、かつ、服用回数が同じであるものについては、1 剤とするものである。したがって、薬剤料を計算する際、服用法が異なると計算方法が違ってくる点に注意する必要がある。

例えば

1 日につき 抗生物質 A (250mg × 3 カプセル) 薬価 1 カプセル 44.60円

1 日につき 鎮痛消炎薬 B (75mg × 3 錠) 薬価 1 錠 24.40円

を投与する場合

処方例 1（服用時点・服用回数がすべて同一の場合）

処方 ①	抗生物質 A	3 カプセル	1 日 3 回	<u>毎食後服用</u>	3 日分
②	鎮痛消炎薬 B	3 錠	1 日 3 回	<u>毎食後服用</u>	3 日分

〈薬価計算〉

処方①，②は服用時点および服用回数がすべて同一であるので，これらの処方の 1 日分の薬価を合計したものが 1 単位となる。

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{A} & \text{B} \\
 (44.60\text{円} \times 3 \text{ カプセル}) + (24.40\text{円} \times 3 \text{ 錠}) & = & 207\text{円} \\
 133.8\text{円} & & 73.2\text{円} \\
 207\text{円} - 15\text{円} = 192\text{円} & & 192\text{円} \div 10 = 19.2\text{点} \rightarrow 20\text{点} \\
 & & 20\text{点} + 1\text{点} = 21\text{点} \\
 \text{すなわち，薬剤料は} & & 21\text{点} \times 3 \text{ 日分} = 63\text{点}
 \end{array}$$

処方例 2（服用時点又は服用回数が異なる場合）

処方 ①	抗生物質 A	3 カプセル	1 日 3 回	<u>毎 8 時間服用</u>	3 日分
②	鎮痛消炎薬 B	3 錠	1 日 3 回	<u>毎食後服用</u>	3 日分

〈薬価計算〉

処方①，②は服用回数が同じでも，服用時点が異なるので

処方①，②はそれぞれが 1 単位となる

$$\begin{array}{rcl}
 \text{A } \{(44.60\text{円} \times 3 \text{ カプセル}) - 15\text{円}\} \div 10\text{円} & = & 11.88\text{点} \rightarrow 12\text{点} + 1\text{点} = 13\text{点} \\
 133.8\text{円} & & \\
 \text{B } \{(24.40\text{円} \times 3 \text{ 錠}) - 15\text{円}\} \div 10\text{円} & = & 5.82\text{点} \rightarrow 6\text{点} + 1\text{点} = 7\text{点} \\
 73.2\text{円} & &
 \end{array}$$

すなわち，薬剤料は $13\text{点} \times 3 \text{ 日分} + 7\text{点} \times 3 \text{ 日分} = 60\text{点}$

したがって，本点数表14頁以降（分割経口投与 1 剤）にある使用量に応じた点数は，1 剤のみを投与した場合あるいは他の薬剤と用法が異なっている場合のものであるのでご留意いただきたい。

◎注射料の算定について

入院中の患者以外の患者に対して注射を行った場合は、手技料として1回につき皮内、皮下及び筋肉内注射は18点、静脈内注射は30点（6歳未満の乳幼児に対して静脈内注射を行った場合は72点）及び薬剤料が算定できる。

なお、溶解剤の添付がない薬剤を溶解して、注射する場合には、溶解剤を合せて請求することができる。

注射薬剤料は、1回の使用量につき、次のとおり算定する。

$$1 \text{ 点} + \frac{(\text{薬価} - 15\text{円})}{10\text{円}} \text{ 点} \quad (1 \text{ 点未満の端数は切り上げ)}$$

但し、薬価15円以下……1点

◎薬剤情報提供料の算定について

入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合は、月1回に限り（処方の内容に変更があった場合はその都度）10点を算定できる。

また、患者の求めに応じ、処方した薬剤の名称、保険医療機関名、処方年月日等を当該患者の手帳に記載した場合は、3点が加算され、13点となる。

なお、薬剤情報提供料は処方せんを交付した患者については算定できない。

◎使用薬剤の内容に係るレセプト記載について

原則としてすべての使用薬剤について、医薬品名、規格・単位（％，mL又はmg等）及び使用量を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する。

ただし、医事会計システムの電算化が行われていないため従来から手書きにより請求が行われている医療機関であって、届出を行った場合は、薬剤料に掲げる所定単位の薬価が175円以下については記載の必要はない。

内用薬・注射薬・外用薬

解熱鎮痛消炎薬（頓用）

（頓服投与の場合）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・1回量	薬 価	1 回	備 考
				円	点	
⑨	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	1錠 13.10	1	1回 25～50mg
⑨	ボルタレン錠 25mg		25mg 2錠		3	
⑨	アデフロニック錠 25mg		25mg 1錠	1錠 5.60	1	1回 25～50mg
⑨	アデフロニック錠 25mg		25mg 2錠		1	
	ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	1錠 17.50	2	1回 60～120mg
	ロキソニン錠 60mg		60mg 2錠		3	
⑨	ロキソニン細粒 10%		10% 1g	1g 32.30	3	1回細粒として60～120mg
⑨	㊦スリノフェン錠 60mg		60mg 1錠	1錠 9.60	1	1回 60～120mg
⑨	㊦スリノフェン錠 60mg		60mg 2錠		2	
⑨	ロブ錠 60mg		60mg 1錠	1錠 7.80	1	1回 60～120mg
⑨	ロブ錠 60mg		60mg 2錠		2	
	ポンタールカプセル 250mg	メフェナム酸	250mg 1カプセル	1カプセル 9.30	1	1回250～500mg
	ポンタールカプセル 250mg		250mg 2カプセル		2	
	オパイリン錠 125mg	フルフェナム酸アルミニウム	125mg 2錠	1錠 9.20	2	1回250mg
	オパイリン錠 250mg		250mg 1錠	1錠 12.40	1	
	フロベン錠 40	フルルビプロフェン	40mg 1錠	1錠 16.00	2	1回 40～80mg
	フロベン錠 40		40mg 2錠		3	
	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	100mg 3錠	1錠 7.90	2	1回300mg
	㊦ペオン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	1錠 19.20	2	1回 80～160mg
	㊦ペオン錠 80		80mg 2錠		4	
	㊦ソレトン錠 80		80mg 1錠	1錠 19.20	2	1回 80～160mg
	㊦ソレトン錠 80		80mg 2錠		4	
	ニフラン錠 75mg	プラノプロフェン	75mg 1錠	1錠 12.00	1	1回 75mg
	フェナブックスカプセル 50mg	アンフェナクナトリウム水和物	50mg 1カプセル	1カプセル 17.40	2	1回 50mg
	ジソペイン錠 75	モフェゾラク	75mg 1錠	1錠 25.50	3	1回 75～150mg
	ジソペイン錠 75		75mg 2錠		5	
	バファリン配合錠A330	アスピリン・ダイアルミネート	330mg 2錠	1錠 5.70	1	
	キョーリン AP2 配合顆粒	シメトリド無水カフェイン顆粒	0.5g	1g 12.00	1	1回0.5g
	S G 配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛配合剤	1g	1g 11.10	1	1回1～2g
	㊦アセトアミノフェン		0.5g	1g 7.20	1	通常1回0.5g
⑨	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	200mg 2.5錠	1錠 8.10	2	1回2.5錠
⑨	カロナール錠 300		300mg 1錠	1錠 9.00	1	1回1錠～
⑨	カロナール細粒 20%		20% 2.5g	1g 8.60	2	1回細粒として2.5g
⑨	カロナール細粒 50%		50% 1g	1g 10.20	1	1回細粒として1g
	ロルカム錠 2mg	ロルノキシカム	2mg 4錠	1錠 18.20	7	
	ロルカム錠 4mg		4mg 2錠	1錠 25.80	5	

注）カロナール，ポンタールカプセル，キョーリン AP2 顆粒は，添付文書の用法に頓用の記載がないが，使用経験から汎用度の高いことを考慮して表示した。

催 眠 鎮 静 薬 (頓用)

(頓服投与の場合)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・1回量	薬 価	1 回	備 考	
	ベンゾジアゼピン系製剤 (短期作用型)			円	点		
	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム	0.125mg	1錠	1錠 10.20	1	} 高齢者には1回 0.125mg～0.25mgまで
	ハルシオン0.125mg錠		0.125mg	2錠		2	
	レンドルミンD錠 0.25mg	プロチゾラム	0.25mg	1錠	1錠 26.40	3	
	リ ス ミ ー 錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	1mg	1錠	1錠 18.90	2	} 高齢者には1回2mg まで
	リ ス ミ ー 錠 2mg		2mg	1錠	1錠 29.70	3	
	エバミール錠 1.0	ロルメタゼパム	1mg	1錠	1錠 20.80	2	} 高齢者には1回2mg まで
	エバミール錠 1.0		1mg	2錠		4	
	ロラメット錠 1.0		1mg	1錠	1錠 21.90	2	} 高齢者には1回2mg まで
	ロラメット錠 1.0		1mg	2錠		4	
	(中期作用型)						
	ネ ル ボ ン 錠 5mg	ニトラゼパム	5mg	1錠	1錠 11.00	1	} 高齢者には1回1mg まで
	ベンザリン錠 5		5mg	1錠	1錠 11.00	1	
	サイレース錠 1mg	フルニトラゼパム	1mg	1錠	1錠 15.10	2	
	ロヒプノール錠 1		1mg	1錠	1錠 14.20	1	
	ユーロジン1mg錠	エスタゾラム	1mg	1錠	1錠 9.90	1	
	ユーロジン1mg錠		1mg	2錠		2	
	エリミン錠 3mg	ニメタゼパム	3mg	1錠	1錠 14.60	1	
	(長期作用型)						
	ベノジールカプセル 10	フルラゼパム塩酸塩	10mg	1カプセル	1カプセル 8.90	1	
	ベノジールカプセル 15		15mg	1カプセル	1カプセル 10.80	1	
	ダルメートカプセル 15		15mg	1カプセル	1カプセル 10.80	1	
	ソメリン錠 5mg	ハロキサゾラム	5mg	1錠	1錠 18.60	2	
	ソメリン錠 10mg		10mg	1錠	1錠 27.80	3	
	(超短期作用型)						
	アモバン錠 7.5	ゾピクロン	7.5mg	1錠	1錠 23.10	2	
	その他の製剤						
	㊦プロモバレリル尿素 (プロバリン)	プロモバレリル尿素	0.5g	1g	8.80	1	通常1回0.5g
	ラ ボ ナ 錠 50mg	ペントバルビタルカルシウム	50mg	1錠	9.10	1	
	㊦トリクロリールシロップ 10%	トリクロホスナトリウム	10%	5mL	10% 1mL 11.50	6	トリクロホスナトリウム として 0.5g
	㊦トリクロリールシロップ 10%		10%	10mL		11	1g
	㊦トリクロリールシロップ 10%		10%	20mL		23	2g
							ただし総量として20mL (シロップ)を超えない こと

(分割経口投与 1 剤)

— 14 —

解熱鎮痛消炎薬

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規 格 ・ 単 位	薬 価	使 用 量				備 考
					2	3	4	6	
⑨	アントラニル酸系製剤			円	点	点	点	点	酸 性
	ポントールカプセル 250mg	メフェナム酸	250mg 1 カプセル	9.30	2	3	4	6	
	ポ ン タ ー ル 錠 250mg		250mg 1 錠	9.30	2	3	4	6	
	ポ ン タ ー ル 細 粒 98.5%		98.5% 1 g	26.20					
	ポ ン タ ー ル 散 50%		50% 1 g	15.90					
	マイカサルカプセル 250mg		250mg 1 カプセル	5.40	1	2	2	3	
	オ パ イ リ ン 錠 125mg	フルフェナム酸アルミニウム	125mg 1 錠	9.20	2	3	4	6	
	オ パ イ リ ン 錠 250mg		250mg 1 錠	12.40	2	4	5		
	オキシカム系製剤								酸 性
	ロ ル カ ム 錠 2mg	ロルノキシカム	2mg 1 錠	18.20			7		
	ロ ル カ ム 錠 4mg		4mg 1 錠	25.80	5	8	10	15	
⑩ ⑩ ⑩	㊦ア ス ピ リ ン バファリン配合錠A330	アセチルサリチル酸 アスピリン・ダイアルミネート	10 g 330mg 1 錠	19.80 5.70	1	2	2	3	酸 性
	㊦ソランタール錠 50mg ㊦ソランタール錠 100mg	チアラミド塩酸塩	50mg 1 錠 100mg 1 錠	9.60 12.80	2 3	3 4	4 5	6	塩基性
	メ プ ロ ン 顆 粒 30%	エピリゾール	30% 1 g	27.30					
	㊦ベ ン ト イ ル 錠 100mg ㊦ベ ン ト イ ル 錠 200mg ㊦セラピエース錠 100 ㊦セラピエース錠 200	エモルファゾン	100mg 1 錠 200mg 1 錠 100mg 1 錠 200mg 1 錠	7.80 13.10 6.20 9.00	2 3 1 2	2 4 2 3	3 5 2 4	5 4	塩基性
	そ の 他								
	キョーリンAP2配合顆粒	シメトリド無水カフェイン顆粒	1 g	12.00					
	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	100mg 1 錠	68.70			27	41	
	セレコックス錠 200mg		200mg 1 錠	105.90	21	32			
	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・ アセトアミノフェン配合剤	1 錠	70.10	14		28	42	
									配合剤 COX-2 選択的 阻害薬 慢性疼痛／抜歯後 疼痛治療剤

三 叉 神 経 痛 用 薬

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規 格 ・ 単 位	薬 価	使 用 量				備 考
					2	3	4	6	
				円	点	点	点	点	
	テグレトール錠 100mg	カルバマゼピン	100mg 1錠	7.60	2	2	3	5	
	テグレトール錠 200mg		200mg 1錠	12.10	2	4	5		
	テグレトール細粒 50%		50% 1g	26.00					

精 神 神 経 用 薬 (抗不安薬)

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規 格 ・ 単 位	薬 価	使 用 量				備 考
					2	3	4	6	
				円	点	点	点	点	
	ベンゾジアゼピン製剤 (短期作用型)								
	㊦デパス錠 0.5mg	エチゾラム	0.5mg 1錠	9.00	2	3			高齢者には1日 1.5mgまで
	リゼ錠 5mg	クロチアゼパム	5mg 1錠	6.70	1	2			
	(中期作用型)								
	ワイパックス錠 0.5	ロラゼパム	0.5mg 1錠	6.10	1	2	2	4	高齢者には1日 1.2mgまで
	コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム	0.4mg 1錠	9.40	2	3			
	ソラナックス0.4mg錠		0.4mg 1錠	9.20	2	3			
	レキソタン錠 1	プロマゼパム	1mg 1錠	5.60	1	2	2	3	
	(長期作用型)								
	㊦2mgセルシン錠	ジアゼパム	2mg 1錠	5.90	1	2	2		1日量2～5mg 外来患者には 原則として1 日15mg以内
	セルシン散 1%		1% 1g	17.30					
	セルシンシロップ 0.1%		0.1% 1mL	17.60					
	㊦ホリゾン錠 2mg		2mg 1錠	5.90	1	2	2		
	ホリゾン散 1%		1% 1g	16.10					
	セレナール錠 5	オキサゾラム	5mg 1錠	5.60	1	2	2	3	
	セパゾン錠 1	クロキサゾラム	1mg 1錠	5.60	1	2	2	3	
	レスミット錠 5	メダゼパム	5mg 1錠	5.60	1	2	2	3	
	㊦メンドンカプセル 7.5mg	クロラゼブ酸ニカリウム	7.5mg 1カプセル	11.40	2	3	5		
	エリスパン錠 0.25mg	フルジアゼパム	0.25mg 1錠	8.60	2	3			
	メレックス錠 0.5mg	メキサゾラム	0.5mg 1錠	7.20	1	2	3	4	高齢者には1日 1.5mgまで
	㊦レスタス錠 2mg	フルトプラゼパム	2mg 1錠	20.40	4	6			
	メイラックス錠 1mg	ロフラゼブ酸エチル	1mg 1錠	21.60	4				

抗ヒスタミン薬

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量				備 考
					2	3	4	6	
				円	点	点	点	点	
	㊤アレルギン散 1%	} クロルフェニラミンマレイン酸塩	1%	1 g	8.10				
	ポ ラ ラ ミ ン 錠 2mg		2 mg	1 錠	5.60	1	2	2	
	レスタミンコーワ錠 10mg	} ジフェンヒドramin塩酸塩	10mg	1 錠	5.90	1	2	2	
	ベ ナ 錠 10mg		10mg	1 錠	5.90	1	2	2	4
	ペリアクチン錠 4mg	} シプロヘプタジン塩酸塩	4 mg	1 錠	5.70	1	2		
	ペリアクチン散 1%		1%	1 g	7.20				
	ホモクロミン錠 10mg	ホモクロルシクリジン塩酸塩	10mg	1 錠	6.50	1	2	3	4
	タベジール錠 1mg	クレマスチンフマル酸塩	1 mg	1 錠	8.30	2	2		
	㊤ニボラジン錠 3mg	} メキタジン	3 mg	1 錠	8.20	2	2		
	㊤ゼスラン錠 3mg		3 mg	1 錠	8.20	2	2		
	ベネン錠 1mg	トリプロロジン塩酸塩水和物	1 mg	1 錠	6.00	1	2	2	4

抗菌薬の【使用上の注意】

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、
 疾病の治療上必要な最少限の期間の投与にとどめること。

(脚注参照)

抗 菌 薬 (抗生物質および合成抗菌薬)

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
	ペニシリン系			円	点	点	点	点	点	
	ペン グ ッ ド 錠 250mg	バカンピシリン塩酸塩	250mg 1 錠	11.70	2	4	5			
	㊦サワシリンカプセル 250	アモキシシリン水和物	250mg 1 カプセル	12.80	3	4	5	8		
	サ ワ シ リ ン 錠 250		250mg 1 錠	13.00	3	4	5	8		
	サ ワ シ リ ン 細 粒 10%		100mg 1 g	11.70						
	㊦パセトシンカプセル 125		125mg 1 カプセル	10.30	2	3	4	6	8	
	㊦パセトシンカプセル 250		250mg 1 カプセル	10.30	2	3	4	6		
	パ セ ト シ ン 錠 250		250mg 1 錠	10.70	2	3	4	6		
	パ セ ト シ ン 細 粒 10%		100mg 1 g	10.40						
㊦	㊦アモキシシリンカプセル 250mg「タツミ」		250mg 1 カプセル	8.60	2	3	3	5		
㊦	㊦アモキシシリンカプセル 250mg「トーワ」		250mg 1 カプセル	8.60	2	3	3	5		
㊦	㊦アモリンカプセル 125		125mg 1 カプセル	13.30	3	4	5	8	11	
㊦	㊦アモリンカプセル 250		250mg 1 カプセル	18.10	4	5	7	11		
㊦	ア モ リ ン 細 粒 10%		100mg 1 g	11.90						
㊦	ワイドシリン細粒 200		200mg 1 g	13.60						

注) 抗菌薬の安易な使用に基づく MRSA 等の院内感染防止を考慮した抗菌薬の投薬法として、厚生労働省は、抗菌薬添付文書の「使用上の注意」において、「一般的注意」事項に先立って、抗菌薬のうち「細菌性感染症を効能・効果」とするものに対しては、添付文書に上記の枠で囲んだ注意事項を表示することにより、抗菌薬投与の際の注意を喚起したものである。

抗 菌 薬（抗生物質および合成抗菌薬）

（分割経口投与1剤）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
	ビクシリンカプセル 250mg ビクシリンドライシロップ 10%	} アンピシリン水和物	250mg 1 カプセル	20.60	点	点	点	点	点	
			100mg 1 g	13.10	4	6	8	12		
	セ フェ ム 系									
	オ ラ セ フ 錠 250mg	セフロキシム アキセチル	250mg 1 錠	60.90	12	18	24	37		第2世代
	㊦ ト ミ ロ ン 錠 50	} セフテラム ピボキシル	50mg 1 錠	32.80	7	10	13	20		第3世代
	㊦ ト ミ ロ ン 錠 100		100mg 1 錠	39.90	8	12	16	24		
	㊦ メイアクト MS 錠 100mg	} セフジトレン ピボキシル	100mg 1 錠	55.60	11	17	22	33		第3世代
	㊦ メイアクトMS小児用細粒 10%		100mg 1 g	209.40						
	㊦ セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」		100mg 1 錠	38.90	8	12	16	23		
	㊦ バ ナ ン 錠 100mg	} セフボドキシム プロキセチル	100mg 1 錠	75.90	15		30			第3世代
	㊦ セ ボ キ シ ム 錠 100mg		100mg 1 錠	43.30	9		17			
	㊦ バナセファン錠 100mg		100mg 1 錠	43.30	9		17			
	㊦ フロモックス錠 75mg	} セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	75mg 1 錠	54.10				32		第3世代
	㊦ フロモックス錠 100mg		100mg 1 錠	55.00		16				
	㊦ セフゾンカプセル 50mg	} セフジニル	50mg 1 カプセル	54.30	11	16	22	33		第3世代
	㊦ セフゾンカプセル 100mg		100mg 1 カプセル	63.00	13	19				
	㊦ ケフラールカプセル 250mg	} セファクロル	250mg 1 カプセル	53.70	11	16	21			第1世代
	㊦ ケフラール細粒小児用 100mg		100mg 1 g	43.50						
	㊦ エリカナールカプセル 250		250mg 1 カプセル	22.60	5	7	9			
	㊦ ケフボリンカプセル 250		250mg 1 カプセル	22.60	5	7	9			
	㊦ ケフレックスカプセル 250mg	} セファレキシシ	250mg 1 カプセル	30.70	6	9	12	18		第1世代
	㊦ ケフレックスシロップ用細粒 100		100mg 1 g	23.80						
	L-ケフレックス顆粒		500mg 1 g	79.40						
	L-ケフレックス小児用顆粒		200mg 1 g	70.10						
	㊦ シンクルカプセル 250mg		250mg 1 カプセル	11.50	2	3	5	7		
	シ ン ク ル 錠 250		250mg 1 錠	11.50	2	3	5	7		
	㊦ センセファリンカプセル 125		125mg 1 カプセル	28.80	6	9	12	17	23	
	㊦ センセファリンカプセル 250		250mg 1 カプセル	30.90	6	9	12	19		
	㊦ ラ リ キ シ ン 錠 250mg		250mg 1 錠	11.50	2	3	5	7		
	㊦ センセファリンシロップ用細粒 10%		100mg 1 g	17.20						

抗 菌 薬（抗生物質および合成抗菌薬）

（分割経口投与 1 剤）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	ペ ネ ム 系			円	点	点	点	点	点	
	㊤フ ァ ロ ム 錠 150mg	} ファロベネムナトリウム水和物	150mg 1 錠	65.00		19				
	㊤フ ァ ロ ム 錠 200mg		200mg 1 錠	66.10		20				
	㊤ファロムドライシロップ小児用 10%		100mg 1 g	160.90						
	リンコマイシン系									
	㊤ダラシнкаプセル 75mg	} クリンダマイシン塩酸塩	75mg 1 カプセル	17.30	3	5	7	10	14	
	㊤ダラシнкаプセル 150mg		150mg 1 カプセル	23.40	5	7	9	14		
	マクロライド系									
	ル リ ッ ド 錠 150	} ロキシスロマイシン	150mg 1 錠	69.00	14					
	ル リ シ ン 錠 150mg		150mg 1 錠	29.90	6					
	ロ キ シ マ イ ン 錠 150mg		150mg 1 錠	43.60	9					
	㊤クラリシッド錠 200mg	} クラリスロマイシン	200mg 1 錠	86.10	17					
	㊤ク ラ リ ス 錠 200		200mg 1 錠	83.20	17					
	㊤クラリスロマイシン錠 200mg「トーワ」		200mg 1 錠	50.90	10					
	㊤クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」		200mg 1 錠	39.00	8					
	㊤クラリスロマイシン錠 200mg「日医工」		200mg 1 錠	39.00	8					
	㊤マ イ ン ベ ー ス 錠 200		200mg 1 錠	50.90	10					
	㊤ジョサマイシン錠 50mg	} ジョサマイシン	50mg 1 錠	10.40	2	3	4	6	8	
	㊤ジョサマイシン錠 200mg		200mg 1 錠	19.90	4	6	8	12	16	
	ジョサマイドドライシロップ 10%	} ジョサマイシンプロピオン酸エステル	100mg 1 g	20.60						
	ジョサマイシロップ 3%		30mg 1 mL	6.80						
⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	エ リ ス ロ シ ン 錠 100mg	} エリスロマイシン	100mg 1 錠	8.50	2	3	3	5	7	
	エ リ ス ロ シ ン 錠 200mg		200mg 1 錠	14.70	3	4	6	9	12	
	㊤エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」		200mg 1 錠	8.60	2	3	3	5	7	
	リカマイシンドライシロップ200	ロキタマイシン	200mg 1 g	77.00						
	ジ ス ロ マ ッ ク 錠 250mg	} アジスロマイシン水和物	250mg 1 錠	264.40	53					
	ジスロマック SR 成人用ドライシロップ 2g		2g 1 瓶	2,088.50						

抗 菌 薬（抗生物質および合成抗菌薬）

（分割経口投与 1 剤）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	テトラサイクリン系			円	点	点	点	点	点	
	㊦ミノマイシン錠 50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg 1錠	23.80	5					1カプセル5点
	㊦ミノマイシン錠 100mg		100mg 1錠	51.00	10					
	ミノマイシнкаプセル 50mg		50mg 1カプセル	24.00	5					
	ミノマイシнкаプセル 100mg		100mg 1カプセル	51.00	10					
	ミノマイシン顆粒 2%		20mg 1g	19.60						
	ミノペン顆粒 2%		20mg 1g	11.80						
	㊦ミノペン錠 50		50mg 1錠	16.20	3					
	㊦ミノペン錠 100		100mg 1錠	28.90	6					
	㊦ミノトローワ錠 50		50mg 1錠	16.20	3					
	㊦ミノトローワ錠 100		100mg 1錠	28.90	6					
	ビブラマイシン錠 50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	50mg 1錠	12.30	2	4	5			1錠 1点
	ビブラマイシン錠 100mg		100mg 1錠	21.60	4					1錠 2点
	合成抗菌薬									
	ニューキノロン系									
	タリビッド錠 100mg	オフロキサシン	100mg 1錠	81.30	16	24	33	49		
	バレオンカプセル 100mg	ロメフロキサシン塩酸塩	100mg 1カプセル	61.90	12	19	25	37		
	バレオン錠 200mg		200mg 1錠	108.30	22	32				
	ロメバクトカプセル 100mg		100mg 1カプセル	101.70	20	31	41	61		
	㊦オゼックス錠 75	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg 1錠	74.90	15	22	30	45	60	
	㊦オゼックス錠 150		150mg 1錠	88.20	18	26	35			
	㊦トスキサシン錠 75mg		75mg 1錠	91.70	18	28	37	55	73	
	㊦トスキサシン錠 150mg		150mg 1錠	116.80	23	35	47			
	㊦クラビット錠 250mg	レボフロキサシン水和物	250mg 1錠 (レボフロキサシンとして)	253.60						
	㊦クラビット錠 500mg		500mg 1錠 (レボフロキサシンとして)	452.70						
	㊦クラビット細粒 10%		100mg 1g (レボフロキサシンとして)	116.80						
	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	50mg 1錠	232.60	47	93				
	グレースビット細粒 10%		100mg 1g	592.30						
	その他									
	㊦フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	250mg 1錠	35.50	7			21	28	嫌気性菌 感染症

抗 菌 薬（注射剤）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	備 考
	ペニシリン系			円	
	㊦ビクシリン注射用 0.5 g	} アンピシリン水和物	500mg 1 瓶	219	} 注射用水 5～20mL
	㊦ビクシリン注射用 1 g		1 g 1 瓶	353	
	㊦ビクシリン注射用 2 g		2 g 1 瓶	666	
	セフェム系				
	㊦セフメタゾン静注用 0.5 g	} セフメタゾールナトリウム	500mg 1 瓶	398	} 注射用水20mL
	㊦セフメタゾン静注用 1 g		1 g 1 瓶	504	
	㊦セフメタゾン静注用 2 g		2 g 1 瓶	894	
	ロセフィン静注用 0.5 g	} セフトリアキソンナトリウム水和物	500mg 1 瓶	515	} 注射用水20mL
	ロセフィン静注用 1 g		1 g 1 瓶	788	
	カルバペネム系				
	カルベニン点滴用 0.25 g	} パニペネム・ベタミプロン	250mg 1 瓶	1,012	} 生理食塩液100mL
	カルベニン点滴用 0.5 g		500mg 1 瓶	1,484	
	㊦メロペン点滴用バイアル 0.25 g	} メロペネム水和物	250mg 1 瓶	880	} 生理食塩液100mL
	㊦メロペン点滴用バイアル 0.5 g		500mg 1 瓶	1,192	
	アミノ配糖体系				
	ビスタマイシン筋注 500mg	} リボスタマイシン硫酸塩	500mg 1 管	288	
	ビスタマイシン筋注 1000mg		1 g 1 管	450	

抗 真 菌 薬

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
					1	2	3	4	5	
	フロリードゲル経口用 2%	ミコナゾール	2% 1 g	円 101.60	点	点	点	点	点	1日10~20 g 分4
⑥	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	50mg 1 カプセル	394.80	39	79				
⑥	イトリゾール内用液1%		1% 1 mL	109.70						
⑥	イトラコナゾール錠50「MEEK」		50mg 1 錠	208.70	21	42				
⑥	イトラートカプセル50		50mg 1 カプセル	171.20	17	34				

健 胃 消 化 整 腸 薬

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
				2	3	4	6	8	
	健 胃 薬		円	点	点	点	点	点	
	健胃配合錠「YD」	1 錠	5.80	1	2	2	3		9 錠5 点
	S・M配合散	1 g	6.20						
	つくしA・M配合散	1 g	6.20						
	T M 配 合 散	1 g	6.20						
	K M 散	1 g	6.20						
⑥	ピーマーゲン配合散	1 g	6.20						
	消化酵素製剤および酵母製剤								
	タカザアスターゼ原末	1 g	6.20						
	㊦ジアスターゼ	10 g	24.60						
	㊦パンクレアチン	1 g	6.90						
	㊦乾燥酵母	10 g	24.80						
	消化酵素複合剤								
	ベリチーム配合顆粒	1 g	12.70						
	ポリトーゼカプセル	1 カプセル	8.10	2	2	3	5		
	ポリトーゼ顆粒	1 g	15.10						
	タフマックE配合カプセル	1 カプセル	6.50	1	2	3	4		
	タフマックE配合顆粒	1 g	11.80						
⑥	エクセラーゼ配合錠	1 錠	5.60	1	2	2	3		
⑥	エクセラーゼ配合カプセル	1 カプセル	5.60	1	2	2	3		
⑥	エクセラーゼ配合顆粒	1 g	10.10						
⑥	フェルターゼ配合カプセル	1 カプセル	5.90	1	2	2	4		

健 胃 消 化 整 腸 薬

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
				2	3	4	6	8	
	制 酸 薬		円	点	点	点	点	点	
	㊦乾燥水酸化アルミニウムゲル	1 g	6.90						
	㊦※アルミゲル細粒 99%(中外)	1 g	7.70						
	㊦天然ケイ酸アルミニウム	10 g	10.90						
	㊦合成ケイ酸アルミニウム	10 g	21.60						
	㊦アルミワイス	10 g	24.00						
	㊦炭酸水素ナトリウム	10 g	7.20						
	㊦酸化マグネシウム	10 g	6.90						
	消 化 器 官 用 薬								
	潰瘍病巣保護剤								
	アルサルミン細粒 90%	90% 1 g	6.40						
	マーズレンS配合顆粒	1 g	15.50						
	防御因子増強剤								
	ウルグートカプセル 200mg	200mg 1 カプセル	16.80	3	5				
	整 腸 薬								
	活性生菌製剤								
㊦	ビオフェルミンR錠	1 錠	5.80	1	2	2	3		耐性乳酸菌
㊦	ビオフェルミンR散	1 g	6.20						〃
㊦	エンテロノン-R散	1 g	6.20						〃
㊦	エントモール散	1 g	6.20						〃
㊦	レベニンカプセル	1 カプセル	5.80	1	2				〃
㊦	レベニン散	1 g	6.20						〃
㊦	ラックビーR散	1 g	6.20						〃
㊦	ラクスパン散 1.8%	1 g	6.20						〃
㊦	ビオフェルミン配合散	1 g	6.20						
	ビオスミン配合散	1 g	6.20						
	ラックビー微粒N	1 % 1 g	6.20						
	ミヤBM錠	1 錠	5.60	1	2	2	3	4	
	ミヤBM細粒	1 g	6.20						
㊦	ビフィスゲン散	2 % 1 g	6.20						

注) 消化性潰瘍の既往歴のある患者又は胃腸障害を招きやすい患者に解熱鎮痛消炎薬等を投与する場合、生体防御因子の低下に基づき発現する胃粘膜病変を保護するため、※印の薬剤を適宜併用投与することがある。

ビ タ ミ ン 製 剤

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規 格 ・ 単 位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
				円	点	点	点	点	点	
	ノ イ ビ タ 錠「25」	ビタミンB ₁	25mg 1錠	5.60	1	2	2			
	25mgアリナミンF糖衣錠		25mg 1錠	6.00	1	2	2			
	ベストン糖衣錠(25mg)		25mg 1錠	6.20	1	2	2			
	ジセタミン錠 25		25mg 1錠	6.10	1	2	2			
	フ ラ ビ タ ン 錠 5mg	ビタミンB ₂	5mg 1錠	5.60	1	2	2	3		
	フ ラ ビ タ ン 錠 10mg		10mg 1錠	7.20	1	2	3			
	ハ イ ボ ン 錠 20mg		20mg 1錠	5.60	1					
	ハ イ ボ ン 細 粒 10%		10% 1g	13.80						
	F A D 錠 5mg [TYK]		5mg 1錠	5.60	1	2	2	3		
⑥	ピドキサール錠 10mg	ビタミンB ₆	10mg 1錠	5.60	1	2	2	3		
⑥	アデロキサール散 7.8%		7.8% 1g	57.70						
⑥	ハイコバルカプセル 500μg	ビタミンB ₁₂	0.5mg 1カプセル	24.20	5	7				
⑥	メコバラミン錠500「トーワ」		0.5mg 1錠	5.60		2				
⑥	メチコバル錠 250μg		0.25mg 1錠	12.80	3	4	5	8		
⑥	メチコバル錠 500μg		0.5mg 1錠	18.60	4	6				
⑥	メチコバル細粒 0.1%		0.1% 500mg 1包	25.60						
	㊦アスコルビン酸	ビタミンC	1g	7.20						
	㊦アスコルビン酸散		10% 1g	7.20						
	ハ イ シ ー 顆 粒 25%		25% 1g	6.20						

ビ タ ミ ン 製 剤

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規 格 ・ 単 位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
	ユ ベ ラ 錠 50mg ユ ベ ラ 顆 粒 20%	β ビタミン E	50mg 1 錠 20% 1 g	円 5.60 11.00	点 1	点 2	点 2	点 3	点	
	ノイロビタン配合錠 ビタノイリンカプセル25 ビタノイリンカプセル50 ビタメジン配合カプセル B25 ビタメジン配合カプセル B50 ビタメジン配合散	β ビタミンB ₁ ・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤	1 錠 1 カプセル 1 カプセル 1 カプセル 1 カプセル 1 g	5.70 7.20 13.80 5.60 9.50 27.10	1 1 3 1 2	2 2 2 2	2 3 2			
	シナール 配合錠 シナール配合顆粒 ワッサー V 配合顆粒	β ビタミンC, パントテン酸配合剤	1 錠 1 g 1 g	6.40 6.20 6.20	1	2	3	4		
	調剤用パンビタン末	総合ビタミン	1 g	6.20						
	蛋白アミノ酸製剤 E S ポリタミン配合顆粒 エンシュア・リキッド ツインライン NF 配合経腸用液 ラコール NF 配合経腸用液	総合アミノ酸製剤 経腸成分栄養剤	1 g 10mL (混合調製後の 内用液として) 10mL 10mL	20.40 6.10 8.90 8.40						

止 血 薬

(分割経口投与1剤)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量					備 考
					2	3	4	6	8	
⑥	カルバゾクロム系製剤 S・アドクノン錠 30	アドレノクロムモノアミノグアニジン メシル酸塩水和物	30mg 1錠	円 11.00	点 2	点 3				
	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物	10mg 1錠	6.10	1	2	2	4	5	
	アドナ錠 30mg		30mg 1錠	11.40	2	3				
	アドナ散 10%		10% 1g	44.90						
	タジン錠 30		30mg 1錠	10.20	2	3				
⑥ ⑥ ⑥	抗プラスミン製剤 ㊦トランサミンカプセル 250mg	トラネキサム酸	250mg 1カプセル	10.40	2	3	4	6	8	
	㊦トランサミン錠 250mg		250mg 1錠	10.40	2	3	4	6	8	
	トランサミン散 50%		50% 1g	18.20						
	トランサミンシロップ 5%		5% 1mL	4.30						
	㊦ヘキサトロンカプセル 250mg		250mg 1カプセル	9.90	2	3	4	6	8	
	㊦リカバリンカプセル 250mg		250mg 1カプセル	9.90	2	3	4	6	8	
	ビタミンK ₁ (フィトナジオン)製剤 カチーフN錠 5mg	フィトナジオン	5mg 1錠	17.80	4	5	7	11		
	カチーフN散 10mg/g		1% 1g	34.30						
	ケーワン錠 5mg		5mg 1錠	15.40	3	5	6	9		
	配 合 剤 オファルムK配合錠	カルバゾクロム・ アスコルビン酸配合剤	1錠	16.20	3	5	6	10		

酵 素 製 剤（消炎酵素薬）

（分割経口投与1剤）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量				備 考
					2	3	4	6	
	エンピナース・Pカプセル9000 エンピナース・P錠18000	} プロナーゼ	9,000単位 1カプセル	10.80	点	点	点	点	
			18,000単位 1錠	18.40	2	3	4	6	
					4	6			

注）酵素製剤（消炎酵素薬）の体内での作用機序は、なお解明されない点も多く、また、用量・効果の関係も必ずしも明らかにされていない。従って漫然と投与すべきでない。

漢 方 薬

（分割経口投与1剤）

後 発 品	製 品 名	規格・単位	薬 価	備 考
			円	
	ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	1 g	11.00	歯牙痛、抜歯後の疼痛、 歯齦炎など
	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	1 g	24.30	口内炎
	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	1 g	18.00	口内炎
	ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用）	1 g	34.60	口内炎
	コタロー黄連湯エキス細粒	1 g	28.50	口内炎
	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒（医療用）	1 g	8.80	口内炎
	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	1 g	15.10	口渇
	コタロー五苓散料エキス細粒	1 g	12.80	口渇
	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	1 g	19.10	口渇
	コタロー白虎加人参湯エキス細粒	1 g	9.80	口渇
	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1 g	8.60	歯槽膿漏、歯齦炎
	コタロー排膿散及湯エキス細粒	1 g	6.30	歯槽膿漏、歯齦炎

ト ロ ー チ 剤 (外用)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量				
					2	3	4	6	8
				円	点	点	点	点	点
⑧	S P トローチ 0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	0.25mg 1錠	5.60	1	2	2	3	
	オラドール S トローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	0.5mg 1錠	5.80	1	2	2	3	
⑧	スプロールトローチ 2mg	セチルピリジニウム塩化物水和物	2mg 1錠	5.60	1	2	2		

含 嗽 剤 (外用)

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量			
					2	4	6	8
				円	点	点	点	点
	アズノール錠 2mg	アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物	2mg 1錠	6.90	1	3	4	6
	アズノール・ガーゲル顆粒 0.4%		0.4% 1g	6.20				
	含嗽用ハチアズレ顆粒		0.1% 1g	6.00				
⑧	アズレイうがい液 4%		4% 1mL	46.80				
⑧	アズノールうがい液 4%		4% 1mL	46.80				
⑧	マズレニンガーゲル散 0.4%		0.4% 1g	6.20				
⑧	AZ 含嗽用配合細粒「NP」		0.1% 1g	6.00				
	イソジンガーゲル液 7%	ポビドンヨード	7% 1mL	3.30				
⑧	ネオヨジンガーゲル 7%		7% 1mL	2.40				
⑧	オラロン含嗽用液 7%		7% 1mL	2.40				
	デンターゲル含嗽用散 20mg/包	フラジオマイシン硫酸塩	FRM20mg 1包	21.20				
	ネオステリングリーンうがい液 0.2%	ベンゼトニウム塩化物	1mL	5.40				
	ベンゼトニウム塩化物うがい液 0.2%「KYS」		1mL	4.80				

注) アズノール錠は、内用・外用薬の重複承認であるため、外用（洗口）薬に適用しても、内用薬の薬価を充当する。

口腔用軟膏剤（外用）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量				
					2	3	4	6	8
				円	点	点	点	点	点
⑧	アフタゾロン口腔用軟膏 0.1%	デキサメタゾン	0.1% 1 g	65.00					
	デキサルチン口腔用軟膏 1mg/g		0.1% 1 g	59.80					
	デキサメタゾン軟膏口腔用 0.1%〔CH〕		0.1% 1 g	59.80					
⑧	デルゾン口腔用軟膏 0.1%		0.1% 1 g	59.80					
⑧	ケナログ口腔用軟膏 0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1% 1 g	69.60					
	オルテクサー口腔用軟膏 0.1%		0.1% 1 g	67.10					
	デスパコーワ口腔用クリーム	クロルヘキシジン塩酸塩	1 g	33.70					
	その他の製剤								
	テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ ヒドロコルチゾン軟膏	1 g	33.20					
	ヒノポロン口腔用軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ ヒノキチオール配合剤軟膏	1 g	172.70					
	テトラサイクリン塩酸塩パスタ 3%〔昭和〕	テトラサイクリン塩酸塩パスタ	30mg 1 g	228.70					
	テトラサイクリン・プレステロン 歯科用軟膏	エピジヒドロコレステリンテト ラサイクリン塩酸塩軟膏	1 g	233.30					

その他の口腔用薬（外用）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規格・単位	薬 価	使 用 量				
					2	3	4	6	8
				円	点	点	点	点	点
	アズノールS T錠口腔用 5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg 1錠	17.50	3	5	7		
	アフタッチ口腔用貼付剤 25μg	トリアムシノロンアセトニド	25μg 1錠	41.50	8	12	17	25	
	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸ナトリウム	50μg 1カプセル	50.20	10	15			
	サリベートエアゾール		50g 1個	641.20					
	⑧ヨードホルム	ヨードホルム	1g	18.90					
⑧	ワプロン口腔用貼付剤 25μg	トリアムシノロンアセトニド	25μg 1枚	41.50	8	12	17	25	
⑧	アフタシール 25μg		25μg 1枚	41.50	8	12	17	25	

坐 薬（外用）

後 発 品	製 品 名	一 般 名	規 格 ・ 単 位	薬 価	使 用 量			
					1	2	3	4
				円	点	点	点	点
	エ ス ク レ 坐 剤「250」 エ ス ク レ 坐 剤「500」	抱水クロラル	250mg 1個	38.60	4	8	12	
			500mg 1個	49.50	5	10	15	
	ワコビタール坐剤 15 ワコビタール坐剤 30 ワコビタール坐剤 50 ワコビタール坐剤 100 ルピアール坐剤 25 ルピアール坐剤 50 ルピアール坐剤 100	フェノバルビタールナトリウム	15mg 1個	34.00	3	7	10	
			30mg 1個	47.20	5	9	14	
			50mg 1個	59.10	6	12	18	
			100mg 1個	73.60	7	15	22	
			25mg 1個	40.00	4	8	12	
			50mg 1個	55.10	6	11	17	
			100mg 1個	69.40	7	14	21	
	アルピニー坐剤 50 アルピニー坐剤 100 アルピニー坐剤 200 アンヒバ坐剤小児用 50mg アンヒバ坐剤小児用 100mg アンヒバ坐剤小児用 200mg カロナール坐剤小児用 50 カロナール坐剤 100 カロナール坐剤 200	アセトアミノフェン	50mg 1個	19.30	2	4	6	
			100mg 1個	19.30	2	4	6	
			200mg 1個	30.00	3	6		
			50mg 1個	19.30	2	4	6	
			100mg 1個	19.30	2	4	6	
			200mg 1個	30.00	3	6		
			50mg 1個	19.30	2	4	6	
			100mg 1個	19.30	2	4	6	
			200mg 1個	30.00	3	6		
	㊦インドメタシン坐剤 ㊦インドメタシン坐剤 ㊦インテバン坐剤 25 ㊦インテバン坐剤 50	インドメタシン	25mg 1個	19.30	2	4		
			50mg 1個	19.30	2	4		
			25mg 1個	19.30	2	4		
			50mg 1個	19.30	2	4		
	ボルタレンサポ 12.5mg ボルタレンサポ 25mg ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1個	44.30	4	9		
			25mg 1個	51.40	5	10		
			50mg 1個	63.10	6	13		
	アネオール坐剤 50 アネオール坐剤 75 エパテック坐剤 50 エパテック坐剤 75	ケトプロフェン	50mg 1個	37.50	4	7		
			75mg 1個	38.30	4	8		
			50mg 1個	41.30	4	8		
			75mg 1個	47.60	5	10		

注）小児が発熱による嘔吐などで経口投与が困難な場合には坐薬を使用するとよいが、アセトアミノフェン製剤は歯科適応症がないので、使用時にはレセプトの摘要欄に投与理由の記載が必要である。

歯科適応のある抗菌薬（内用薬）

		製 品 名	一 般 名	歯周組織炎	歯冠周囲炎	顎 炎	拔牙創・口腔手術創の二次感染	顎骨周辺の蜂巣炎	上顎洞炎	感染性口内炎	化膿性唾液腺炎
ペニシリン系		サワシリン, パセトシン, アモリン ^後 , ワイドシリン ^後	アモキシシリン水和物	●	●	●					
		ビクシリン, ソルシリン ^後	アンピシリン水和物	●	●	●	●				
		ペングッド	バカンピシリン塩酸塩	●	●		●				
		オラセフ	セフトキシムアキセチル	●	●	●					●
セフェム系		ケフラール, エリカナール ^後 , ケフボリン ^後	セフアクロル	●	●	●					
		ケアレックス, シンクル ^後 , センセフアリン ^後 , ラリキシ ^後 (錠剤・カプセル・細粒剤により適応が異なる)	セフアレキシ	●	●	●	●		●		●
		セフゾン	セフジニル	●	●	●					
		トミロン, セトラート ^後 , ボキシロン ^後	セフトラムピボキシ	●	●	●					
		バナシ, セボキシム ^後 , バナセファン ^後	セフポドキシムプロキセチル	●	●	●					
		フロモックス	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	●	●	●					
		メイアクト, セフジトレンピボキシ「サワイ」 ^後 , セフジトレンピボキシ「トーフ」 ^後	セフジトレンピボキシ	●	●	●					
		ファロム	ファロペネムナトリウム水和物	●	●	●					
ペネム系		エリスロマイシン ^後	エリスロマイシン ^後		●						
		エリスロシン	エリスロマイシンステアリン酸塩		●						
		クラリス, クラリシッド, マイネベース ^後 , リクモース ^後	クラリスロマイシン	●	●	●					
		ジスロマック	アジスロマイシン水和物	●	●	●					
		ジョサマイシン	ジョサマイシン	●	●	●			●		●
		ジョサマイ	ジョサマイシンプロピオン酸エステル	●	●	●			●		

歯科適応のある解熱鎮痛消炎薬（内用薬）

	製 品 名	一 般 名	歯 痛	歯 痛 の 消 炎 ・ 鎮 痛 ・ 解 熱	歯 科 治 療 後 の 疼 痛	歯 科 ・ 口 腔 外 科 領 域 に お け る 抜 歯 並 び に 小 手 術 後 の 消 炎 ・ 鎮 痛	歯 髓 炎 の 鎮 痛 ・ 消 炎	歯 根 膜 炎 の 鎮 痛 ・ 消 炎	顎 関 節 症 の 消 炎 ・ 鎮 痛 ・ 解 熱	歯 槽 骨 膜 炎 の 消 炎 ・ 鎮 痛 ・ 解 熱	手 術 後 並 び に 外 傷 後 の 消 炎 ・ 鎮 痛	手 術 後 及 び 外 傷 後 の 炎 症 及 び 腫 脹 の 寛 解	手 術 後 並 び に 外 傷 後 の 炎 症 性 反 応 の 消 炎	手 術 後 、 外 傷 後 並 び に 抜 歯 後 の 消 炎 ・ 鎮 痛	手 術 並 び に 抜 歯 後 の 鎮 痛 ・ 消 炎	外 傷 後 、 小 手 術 後 並 び に 抜 歯 後 の 消 炎 ・ 鎮 痛	抜 歯 後 の 鎮 痛 ・ 消 炎	抜 歯 後 の 疼 痛	抜 歯 後 、 歯 髓 炎 、 歯 根 膜 炎 の 消 炎 ・ 鎮 痛	抜 歯 並 び に 歯 科 領 域 に お け る 小 手 術 後 の 鎮 痛 ・ 消 炎	抜 歯 、 智 歯 周 囲 炎 、 歯 髓 炎 の 消 炎 ・ 鎮 痛	智 歯 周 囲 炎 の 鎮 痛 ・ 消 炎	術 後 疼 痛
アニリン系 サリチル酸 系	ピリナジン、カロナール [®]	アセトアミノフェン	●		●																		
	アスピリン	アスピリン	●																				●
	バファリン	アスピリン・ダイアルミニネート	●																				
アントラニ ル酸系	オパイリン	フルフェナム酸アルミニウム											●				●						
	ボンタール、マイカサル [®]	メフェナム酸		●								●											
	インドメタシン、インテパン [®]	インドメタシン		●					●	●		●											
アリール酢 酸系	ランツジール	アセメタシン									●												
	ボルタレン、アデフロニック [®] 、ソレルモン [®]	ジクロフェナクナトリウム	●												●								
	フェナゾックス	アンフェナクナトリウム水和物							●					●									
	ジソペイン	モフェゾラク												●									

保険医及び保険薬剤師の使用医薬品（保険診療で使用できる歯科用薬剤）

本表に収載されている医薬品は、保険診療において使用可能な歯科用薬剤である。
薬剤料は各診療行為の算定点数に含まれており、別途算定はない。

分類	商品名	備考
根管治療剤	モルホニン歯科用液	
根管治療剤	㊦ キヤナクリン	
根管治療剤	キヤナルクリナーナー歯科用液10%	
根管治療剤	㊦ 歯科用アンチホルミン	
根管治療剤	㊦ 歯科用アンチホルミン「日薬」	
根管治療剤	ネオクリナーナー「セキネ」	
根管治療剤	クレオドン	劇
根管治療剤	クリアエフシー	劇
根管治療剤	歯科用ホルマリンクレゾール	劇
根管治療剤	歯科用ホルムクレゾール「村上」	劇
根管治療剤	ホルモクレゾール歯科用消毒液「昭和」	劇
根管治療剤	ホルムクレゾール FC「ネオ」	劇
根管治療剤	メトコール	劇
根管治療剤	サホライド・RC 液歯科用3.8%	
根管治療剤	ヨードヨード亜鉛カントップ用消毒液「昭和」	劇
根管治療剤	ペリオドン	劇
根管治療剤	ホルマリン・ゲアヤコール FG「ネオ」	劇
根管治療剤	カルビタール	劇
根管治療剤	㊦ 水酸化カルシウム	
鎮痛・鎮静消毒剤	キャンフェニック「ネオ」	劇
鎮痛・鎮静消毒剤	歯科用カルボール	劇
鎮痛・鎮静消毒剤	㊦ フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」	劇

分類	商品名	備考
鎮痛・鎮静消毒剤	㊦ 歯科用フェノール・カンフル「日薬」	劇
鎮痛・鎮静消毒剤	㊦ 歯科用フェノール・カンフル	劇
鎮痛・鎮静消毒剤	村上キャンフェニック	劇
鎮痛・鎮静消毒剤	サホライド液歯科用38%	劇
根管充填剤	クリワソ	
覆罩剤	ネオダイソ	
覆罩剤	パルパック V	劇
軟組織消炎剤	㊦ 歯科用ヨード・グリセリン	劇
軟組織消炎剤	㊦ ヨード・グリセリン歯科用消毒液「昭和」	劇
軟組織消炎剤	㊦ 歯科用ヨード・グリセリン「日薬」	劇
軟組織消炎剤	ネオグリセロール	劇
軟組織消炎剤	㊦ ヨーグリ	劇
軟組織消炎剤	ヨードグリコールパスタ「ネオ」	劇
被覆保護剤	F バニッシュ歯科用5%	劇
被覆保護剤	ダイアデント歯科用ゲル5%	劇
齲蝕抑制剤	弗化ナトリウム液「ネオ」	
齲蝕抑制剤	フルオール液歯科用2%	
齲蝕抑制剤	フルオール・ゼリー歯科用2%	
齲蝕抑制剤	フローデン A 酸性フッ素リン酸溶液	
齲蝕抑制剤	バトラーフローデンフォーム N	

※「備考」欄にある「劇」は劇薬をいう。

抗菌薬の使い方について

抗菌薬の使用上の問題点として、耐性菌と副作用の発現が挙げられる。耐性獲得には、抗菌薬の大量かつ不適切な使用が要因となっており、さらにその過剰投与により、アナフィラキシーショックや腎障害などの重篤な有害反応が生じる原因にもなっている。

平成16年9月付の「抗生物質製剤及び抗菌物質製剤の再評価結果及び効能・効果読替えに関する通知」に基づき、抗菌薬の効能・効果、用法・用量が改訂された。ここには抗菌薬の使い方などについて重要な点を記載した。会員各位におかれては、これらを参考にされて、治療目的に適合した最適の抗菌薬を選択し、治療上必要な最小限の期間の投与にとどめて正しく使用していただきたい。

□ 抗菌薬の選択・使い方の指針

- ・病原菌に有効でできるだけ抗菌スペクトルの狭い薬剤を選択する。
- ・安易に広域スペクトルの抗菌薬を使用すると正常細菌叢を乱し、病原菌に対する防御機能を低下させ、菌交代を起こしやすくする。耐性菌の発現の危険が生じる。
- ・ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系、アミノ配糖体系、ニューキノロン系が治療の主体となる。マクロライド系、テトラサイクリン系、クロラムフェニコール系、リンコマイシン系は、特異的に効く感染症（クラミジア、マイコプラズマ、リケッチア）に主として使用する。
- ・ペニシリン系、セフェム系抗菌薬では、血中濃度が高いほど殺菌作用が強くなるわけではなく、感染部位においてMICより高い濃度をどれだけ長時間持続できるかによって効果に差がある。
- ・新薬や抗菌力の強い薬剤は安易に使用しない。むしろ慎重に使用する。
- ・患者のアレルギー既往、腎・肝障害、基礎疾患の有無、妊娠の可能性、授乳の有無などを投与前に再確認する。
- ・抗菌薬の半減期、排泄経路、臓器移行性、副作用などを確認し、患者の年齢、腎・肝機能、妊娠中などを考慮して適切な投与量、投与期間を設定する。
- ・妊娠中は、不必要な投与は行わない。妊娠12週まではできるだけ薬剤の投与は避ける。特に、ニューキノロン系、テトラサイクリン系、アミノ配糖体系、ST合剤、クロラムフェニコール系は使用すべきではない。比較的安全に使用できるのは、ペニシリン系、セフェム系、マクロライド系である。

□ 抗菌薬の副作用

副作用として肝障害、腎障害、血液障害、薬疹、ビタミンK欠乏による出血傾向などが挙げられる。各種抗菌薬に特徴的な副作用を以下に記した。

○ ペニシリン系

- ・頻度は低いが、アナフィラキシー反応が起こる。
- ・セフェム系、カルバペネム系と交叉反応を有するので、重篤なペニシリンアレルギーの既往歴患者にはこれらの抗菌薬は禁忌となる。投与前の問診を十分に行う。

○ セフェム系

- ・他の抗菌薬に比べて副作用の頻度は低い。皮疹、発熱、下痢などである。
- ・アルコール類と併用すると顔面紅潮、嘔吐、動悸などのジスルフィラム様作用を呈することがある（内服終了後1週間までは禁酒を勧める）。

○ カルバペネム系

- ・高齢者や腎機能低下、てんかんや中枢神経障害のある患者で痙攣等の中枢神経症状が発現しやすくなる。

○ アミノ配糖体系

- ・腎障害、第Ⅷ脳神経障害（難聴）が知られている。定期的に腎機能を検査する。

○ テトラサイクリン系

- ・胎児や小児に骨発育不全、歯の着色、エナメル質形成不全をきたすことがある。妊婦や小児には使用しない。

○ マクロライド系

- ・シサプリド、ピモジドとの併用でQT延長症候群、心室性不整脈、心停止の報告があり、併用禁忌である。

○ クロラムフェニコール系

- ・血液障害（再生不良性貧血など）が知られている。

○ ニューキノロン系

- ・酸性非ステロイド性抗炎症薬との併用で痙攣が発現することがある。妊婦・小児への投与は禁忌である。

□ 服薬指導上の注意

- ・抗菌薬は、「風邪薬」や「解熱鎮痛薬」ではなく、残薬を後日服用したり、他者に渡してはいけないことを伝える。
- ・用法・用量・服薬期間を守ることが治療効果を左右することを説明する。
- ・服用後何らかの異常を感じた時には、ささいな変化であってもすぐに連絡するように伝える。

（治療薬マニュアル2014（医学書院）より一部を抜粋し、改変）